РЕКОМЕНДАЦИИ

Комната пациента:

- *рядом с больным разместить устройство, с помощью которого он сможет позвонить близким: колокольчик, кнопку вызова, радионяню;*
- *всё необходимое (стакан с водой, пульт от телевизора, ходунки, книга) нужно расположить на расстоянии вытянутой руки;*
- *настольную лампу или торшер расположить возле изголовья так, чтобы больной человек смог до неё дотянуться;*
- *у кровати должны быть бортики, чтобы пациент не упал;*
- *если риск падения велик, то следует опустить кровать или постелить рядом с ней матрас*

Коридор*:*

- *убрать лишние предметы и не расставлять их вдоль стен*

Уборная*:*

- *к стенам возле унитаза и ванны прикрепить небольшие поручни;*
- *на пол и дно ванной постелить нескользкие коврики;*
- *избавиться от порога на входе в санузел*

АРХАНГЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ОСНОВАН В 1876 ГОДУ

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Что это такое?



Болезнь Альцгеймера — это хроническое нейродегенеративное заболевание, с медленным началом и значительным ухудшением с течением времени. В 70 % случаев болезнь Альцгеймера приводит к деменции.

Статистика

Встречается в 60–70 % случаев. В мире деменцией страдают около 50 миллионов человек, каждый год выявляется 10 миллионов новых случаев.

Заболевание более распространено среди женщин. Предположительно, это связано со следующими факторами:

- продолжительность жизни женщин больше, чем мужчин;
- риск развития болезни увеличивается на 70 % для людей с депрессией, у женщин она встречается чаще;
- более низкий уровень образования связан с повышенным риском деменции, в некоторых странах у женщин уровень образования ниже, чем у мужчин;
- при беременности часто возникают гипертонические расстройства, они связаны с повышенным риском ухудшения когнитивных функций даже спустя десятилетия после беременности.

Диагностика

Трудности ранней диагностики болезни Альцгеймера во многом объясняются "маскированным" характером заболевания в этот период, когда отсутствуют явные внешние признаки деменции.

Лечение

Болезнь Альцгеймера пока не поддается лечению. Но благодаря группе новых препаратов и симптоматическому лечению Альцгеймера можно сделать так, что снижение интеллекта больных будет более постепенным.